

PATIËNTEN INFORMATIE

Koorts bij kinderen



**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Op de Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis is uw kind door een arts beoordeeld en heeft u advies gekregen over koorts bij uw kind. Het is belangrijk goed op te blijven letten of de situatie bij uw kind verandert. Deze folder kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Wat kunt u zelf doen?

Volg onderstaande adviezen op als uw kind koorts heeft. Wanneer uw kind normaal speelt, drinkt en plast, zijn dat geruststellende tekenen. Dit kan echter veranderen, dus het is belangrijk uw kind goed in de gaten te houden. Let daarbij op de specifieke signalen die beschreven staan in het schema achterin deze folder en volg de bijbehorende adviezen op.

- Geef uw kind genoeg te drinken, bied regelmatig kleine beetjes aan. Geef uw kind geen koolzuurhoudende dranken. Het is niet erg wanneer uw kind een paar dagen niet eet.
- Kleed uw kind niet extra warm aan, maar zorg dat het de warmte kwijt kan.
- Uw kind mag alles doen waar hij of zij energie voor heeft. Extra bedrust is niet nodig, maar laat uw kind rustig uitzieken.
- Als uw kind pijn heeft of oncomfortabel is: geef paracetamol volgens de gebruiksaanwijzing (zie ook verderop in de folder).
- Bij verkoudheid: spoel de neus een paar keer per dag met zout water, of gebruik eventueel een slijmzuiger om de neus open te houden (beide te koop bij de drogist).
- Wanneer uw kind vlekjes krijgt, doe de glastest (zie verderop in de folder).
- Het kan handig zijn per dag bij te houden wat de temperatuur van uw kind is en hoeveel uw kind plast.

Voorlichtingsfilm

U kunt de film [Koorts bij kinderen, tips en adviezen voor een goed herstel](#) bekijken met de belangrijkste informatie over het zorgen voor uw kind met koorts. Wij raden u aan eerst de film te bekijken en dan deze folder door te lezen. U vindt de film op www.sehzorg.nl/informatie/koorts-bij-kinderen/.

Wat is koorts?

Wanneer de temperatuur van het lichaam boven de 38 graden komt is er sprake van koorts. Dit is een normale reactie van het lichaam op een infectie. De temperatuur kan oplopen tot boven de 40 graden en wisselen gedurende de dag of per dag. Dit zegt niets over hoe ernstig de ziekte is en komt vaak voor bij jonge kinderen.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van koorts is meestal een infectie. Ook kan een kind koorts krijgen nadat hij of zij een vaccinatie heeft gehad. Infecties worden meestal door een virus veroorzaakt, zoals bij verkoudheid of griep. In sommige gevallen is er echter een infectie door een bacterie. De meest voorkomende bacteriële infecties bij kinderen zijn een longontsteking of een nierbekkenontsteking. De meest ernstige infecties zijn hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging, maar deze komen zelden voor.

Hoe weet ik dat mijn kind koorts heeft?

Als uw kind koorts heeft, voelt hij of zij warm aan. Uw kind kan moe en hangerig zijn, of minder willen eten of drinken. Ook kan uw kind last hebben van hoesten, keelpijn, buikpijn of hoofdpijn. U kunt met een thermometer de temperatuur van uw kind opmeten. Dit kan met een rectale thermometer (via de billen). Het kan ook via de oksel of mond, of met een oorthermometer. Deze zijn vooral bij baby's echter minder geschikt. Meet de temperatuur in ieder geval telkens op dezelfde manier. Als de temperatuur boven de 38 graden is, heeft uw kind koorts.

Wat is de behandeling?

Paracetamol

Koorts is op zichzelf onschuldig maar geef bij koorts wel paracetamol. Paracetamol voorkomt geen koortsstuipen. Als uw kind pijn heeft, hangerig is of zich ziek voelt, kan paracetamol helpen. Geef paracetamol op vaste tijden volgens de gebruiksaanwijzing. Het gebruik van paracetamol staat de normale genezing van uw kind niet in de weg.

Antibiotica (op recept van een arts)

Bij sommige infecties kunnen antibiotica nodig zijn. Het is belangrijk om te weten dat behandeling met antibiotica niet helpt tegen virussen. Ook kan het niet altijd bacteriële infecties voorkomen. Of uw kind antibiotica nodig heeft, moet door een arts worden beoordeeld. Wanneer uw kind antibiotica gebruikt, kunnen bijwerkingen optreden, zoals huiduitslag, braken of diarree. Als uw kind bijwerkingen krijgt, neemt u dan contact op met uw huisarts.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met uw huisarts of de behandelend arts op de polikliniek.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op:

- <https://sehzorg.nl/informatie/koorts-bij-kinderen/> of scan de QR-code
- www.thuisarts.nl/koorts-bij-kinderen
- www.kindenziek.nl, informatie voor kinderen



Glastest

Doe de 'glastest' als uw kind ziek is en vlekjes krijgt. Duw een glas stevig tegen de huid. Als de vlekjes zichtbaar blijven door het glas heen, kan dit wijzen op ernstige infectie en is het belangrijk snel medische hulp te vragen.



Foto glastest: meningitisnow.org

Koortsstuip

Bij kinderen van 3 maanden tot 6 jaar kan bij koorts een koortsstuip optreden. Dit is een aanval van trekkingen met armen en benen, waarbij het kind het bewustzijn verliest. Het komt bij 1 op de 20 kinderen voor. Meestal gaat de aanval na enkele minuten vanzelf over. Wanneer uw kind een koortsstuip heeft, is het belangrijk bij uw kind te blijven en te zorgen dat hij of zij zich niet kan bezeren. Bel 112 wanneer de stuip langer duurt dan 5-10 min. Bel anders de huisarts, die u als het nodig is verwijst naar een kinderarts. Koortsstuipen veroorzaken geen schade aan de hersenen en bij een gewone koortsstuip is geen aanvullend onderzoek nodig.

Longontsteking

Bij een longontsteking zijn de kleine luchtwegen en longblaasjes ontstoken. Dit kan door een virus of een bacterie worden veroorzaakt. Een longontsteking geeft klachten als koorts, hoesten en benauwdheid en soms buikpijn. Daarnaast kunnen er ook algemene klachten zijn, zoals moeheid en niet willen eten of drinken.

Waar moet u op letten bij uw kind? Uw kind heeft koorts en...

- Reageert niet, is erg moeilijk wakker te maken of is verward
- Wordt blauw, bleek of grauw
- Heeft ademstops of een fors kreunende ademhaling
- Is erg benauwd, 'hapt naar adem'
- Heeft een aanval met trekkingen van armen en/of benen die niet stopt

Bel 112

- Krijgt vlekjes op de huid die niet verdwijnen bij de glastest (zie vorige pagina)
- Is moeilijker wakker te maken
- Wordt binnen enkele uren zieker
- Is ontroostbaar
- Is benauwd of heeft een snelle en/of reutelende ademhaling
- Drinkt veel minder dan normaal
- Plast veel minder dan normaal
- Braakt voortdurend
- Heeft voortdurend diarree
- Heeft pijn bij het plassen
- Heeft koorts die langer duurt dan vijf dagen
- Uw kind is anders dan anders en u maakt zich zorgen

**Neem
nu
contact
op met
uw
(huis)arts**

- Drinkt minder, maar plast regelmatig
- Is hongerig en moe, maar speelt wel
- Heeft geen 'oranje' of 'rode' symptomen zoals hierboven beschreven
- Hoest, maar is niet benauwd
- Huilt meer, is wel te troosten

**Volg
adviezen
in deze
folder**



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

