

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Latexallergie

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





Bij een latexallergie bestaat er een overgevoeligheid voor rubberen producten zoals handschoenen, condooms en ballonnen. De overgevoeligheid kan zich uiten als:

- een contactallergie in de huid (type IV allergie) en/of
- een allergische reactie in de neus, ogen of longen door het inademen van de latexeiwitten (type I allergie).

In deze folder worden de 2 typen allergie beschreven, de specifieke onderzoeken waarmee wij deze typen kunnen aantonen en de gevolgende die ontstaan uit het hebben van een type IV of een type I allergie.

## Type I allergie

### *Wat is het?*

Bij dit 'directe type' allergie staan allergische (IgE) antistoffen centraal. Dit zijn eiwitten die het lichaam maakt en die gericht zijn tegen bepaalde natuurlijk voorkomende stoffen, in dit geval eiwitten van het latexsap.

Bij inademing van latexdeeltjes (vooral bij gepoederde handschoenen) of bij contact met het slijmvlies (operaties, tandarts) kunnen de volgende klachten ontstaan:

- niezen, loopneus, verstopte neus, jeuk in de neus;
- tranen, jeukende en/of rode ogen;
- kortademigheid, hoesten en/of piepende ademhaling;
- jeukende bultjes op de hand binnen 30 minuten na het aantrekken van de handschoenen;
- jeukende bultjes op de rest van het lichaam direct na het dragen van handschoenen;
- zwelling van de handen, oogleden, lippen of tong.

Heeft u deze klachten op de werkplek, bij de tandarts of bij contact met andere rubberen producten (zoals ballonnen, condooms, elastiekjes), dan moet verder onderzoek naar latexallergie gedaan worden.

### *Hoe toont men het aan?*

Door priktesten en/of bloedonderzoek kan de specialist de diagnose bevestigen.

Bij de priktest wordt het allergeen als druppel op de huid gebracht. Daarna prikt men met een lancetje door de druppel oppervlakkig door de huid. De druppel wordt weggehaald met een tissue. Na 15 minuten worden de roodheid en de (kleine) plaatselijke zwelling beoordeeld.

Voor het aantonen van allergische antistoffen gericht tegen latexeiwitten kan ook bloedonderzoek worden gedaan. Het voordeel van het bloedonderzoek is dat dit gedaan kan worden zonder dat er met antiallergische medicatie gestopt hoeft te worden.

### *Gevolgen van een type I latexeiwitallergie*

Bij opnieuw contact met latex kunnen er bij mensen die allergisch zijn ernstige klachten optreden. U moet dus zorgen dat u ook in de toekomst niet met latex in aanraking komt. Belangrijk is:

- Breng uw tandarts en huisarts op de hoogte van uw allergie en dat zij in de toekomst non-latex handschoenen gebruiken bij uw behandeling.
- Dit geldt natuurlijk ook voor toekomstige operaties, bevallingen en andere behandelingen.

Er kan een [Witte Kruis Alarmpenning](#) gekocht worden waarop vermeld staat dat u een type I natuurlatexallergie heeft. Belangrijk is vooral dat mensen in uw directe omgeving op de hoogte zijn van uw allergie voor latex.

Omdat er een relatie is met latexeiwitten moet u alert zijn bij het eten/ drinken van tropische vruchten zoals kiwi, banaan, avocado, papaja, mango en passievrucht. Blijkt uit de allergietest dat u voor deze of meerdere voedingsmiddelen allergisch bent, mag u deze niet meer eten (eventueel met hulp van een diëtiste).

Werkt u zelf met handschoenen, dan moet u non-latex handschoenen gebruiken. Uw collega's moeten poedervrije handschoenen gebruiken, omdat het latexeiwit via dit poeder in de lucht komt en door u ingeademd wordt.

Wat betreft condooms: er zijn non-latex producten op de Nederlandse markt.

## Type IV allergie

### *Wat is het?*

Een type IV allergie is een contactallergie en kan ontstaan na lang (maanden, jaren) in aanraking komen met het betreffende 'allergeen' (dit is een stof die de allergische reactie uitlokt). Vooral de chemische toevoegingen aan het latexsap kunnen aanleiding geven tot het plaatselijke contacteczeem. Als er eenmaal een contactallergie aanwezig is, ontstaan de klachten meestal uren tot dagen na het dragen van bijvoorbeeld rubberen handschoenen. Deze klachten zijn:

- eczeem van de huid, bestaande uit roodheid, jeuk, soms bultjes en blaasjes;
- jeukende bultjes of zwelling van oogleden, lippen of handen.

### *Hoe toont men het aan?*

De diagnose kan door de specialist bevestigd worden met behulp van plakproeven (epicutane test). Bij deze plakproeven worden de allergenen met pleisters aangebracht op het bovenste deel van de rug. Na 72 uur worden de reacties (kleine eczeemplekjes) beoordeeld.

### *Gevolgen van een type IV contactallergie.*

U heeft een contactallergie voor chemische toevoegingen van het natuurlatex en loopt **geen** verhoogd risico bij tandheelkundige en operatieve ingrepen, dus alles waarbij met latexhandschoenen wordt gewerkt.

Omdat u geen allergische antistoffen heeft voor natuurlatex, bestaat er geen kans op een ernstige allergische complicatie tijdens bovengenoemde ingrepen. Om verwarring en mogelijk paniek bij behandelaars te voorkomen hoeft u het zelfs niet te noemen!

Werkt u zelf met latexhandschoenen en heeft u handeczeem, dan is het belangrijk om op zoek te gaan naar handschoenen die het allergeen, waar u contactallergisch voor bent, niet heeft. Dit geldt eveneens voor andere beroepsgroepen die vaak in aanraking komen met het betreffende contactallergeen.

### **Vragen**

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de arts of de assistente van de polikliniek Allergologie via (010) 291 22 15.

*Deze folder is samengesteld onder auspiciën van de Vakgroep Allergologie Nederland.*

## Notities

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

